



Vol.6

Heart

はーと

＼ 1回の採血検査でわかる！？ ＼

最新発症リスク判定

食道がん リスク

2025

4

特集


アルコールリスク検査

（食道がん・頭頸部がんの発症リスクを判定）



原因・症状を知り早期発見！

食道がん



食道は、咽頭（のど）と胃の間をつなぐ管状の臓器です。
食道がんは、食道の内面をおおっている粘膜の表面からできます。食道のどこにでもできる可能性があります、約半数が食道の中央付近からできます。また、食道内にいくつも同時にできることもあります。



症状について

- ☑ 初期には自覚症状がないことがほとんどです。
- ☑ がんが進行するにつれて、飲食時の胸の違和感、飲食物がつかえる感じ、体重減少、胸や背中痛み、咳、嚥声させい（声のかすれ）などの症状が出ます。
- ☑ 飲食物を飲み込んだときに胸の奥がチクチク痛む、熱いものを飲み込んだときにしみる感じがするといった症状があります。胸の違和感は、早期発見のために注意しておきたい症状です。
- ☑ がんが大きくなるにつれて食道の内側が狭くなると、飲食物がつかえやすくなり、次第に軟らかい食べ物しか通らなくなり、飲食物がつかえると食事の量が減り、体重が減少します。



原因

食道がんが発生する主な要因は、喫煙と飲酒です。

特に扁平（へんぺい）上皮がんは、喫煙と飲酒との強い関連があります。

飲酒により体内にはアセトアルデヒドが生じます。アセトアルデヒドは発がん性の物質で、アセトアルデヒドの分解に関わる酵素の活性が生まれつき弱い人は、食道がんが発生する危険性が高まることが報告されています。また、喫煙と飲酒、両方の習慣がある人は、より危険性が高まること指摘されています。



食道がんについて詳しくは、[こちらをクリック↓](https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/index.html)
<https://ganjoho.jp/public/cancer/esophagus/index.html>



**当院では、約5 mlの採血だけで、
食道がんのリスクを調べる検査（アルコールリスク）が行えます。**

<https://kubix.co.jp/business/alc/>

アルコールリスク検査は、採血結果と問診票にて「生活習慣（飲酒歴、喫煙歴、食習慣）」を点数化して、「飲酒タイプ」と合わせて食道がん・頭頸部がんの発症リスクを判定いたします。

詳しい内容や費用については、ハートセンター磐田までお問い合わせください。